









Tarir pour Reproduire

TARITRAL 5 – 25 litres	VELTONIC Granulé 15-25kg
<ul style="list-style-type: none"> Accompagne le tarissement des vaches laitières et allaitantes Soutient la coupure de la sécrétion lactée Repos et Involution de la mamelle 	<ul style="list-style-type: none"> Support minéral satisfaisant les besoins des mères avant mise-bas, participe à la réduction du risque de toxémie de gestation. Favorise le dynamisme de la mise-bas Participe bon déroulement de la période post-partum et la reprise du cycle sexuel Bloc à lécher : NUTRABLOC 310/35
 250 ml / vache après la dernière traite en 1 fois, doubler la distribution si nécessaire	 50g/vache par jour pendant au moins 45 jours avant vêlage.
Le bon démarrage en lactation	La préparation de la reproduction
EPATRAL 5 – 25 litres	FECONDITRAL Granulé 15 kg
<ul style="list-style-type: none"> Soutien des fonctions hépatiques de détoxification Soutien des fonctions digestives, notamment pour la valorisation des matières grasses Participe au confort digestif lié aux sécrétions biliaires et pancréatiques 	<ul style="list-style-type: none"> Accompagne les dernières phases de la maturation folliculaire Participe à la venue en chaleur marquée Yucca pour soutenir les jeunes gestations en limitant les excès azotés
 Bovin adulte : 50 ml/j/6 jours, pour le démarrage en lactation ou d'engraissement, soutien de la production  Veaux : 30 ml/j 6 jours, soutien de la consommation accompagnement des transitions	 Vaches adultes et génisses : 50 g/j par tête sur 21 jours avant la mise à la reproduction
Accompagnement des périodes de transition, d'allotement	
PREMEL 35 BKP Poudre et Granulé 15kg Poudre soluble 5kg	RESPIBOL Bolus de 10g environ Coffret de 30 boli
<ul style="list-style-type: none"> Favorise le confort respiratoire : Nez-Gorge-Oreille Accompagne les changements de lieu de vie et de saison, les périodes d'allotement Soutien digestif de l'appétit Accompagnement du vaccin 	<ul style="list-style-type: none"> Forme bolus de la cible respiratoire (35) Adapté à la distribution aux jeunes veaux Accompagne les vaccinations et la mise en place de l'immunité
 50 g/VL/jours, 10 jours/mois ou pendant 21 jours en cas de forte période de stress.  En cas d'intervention, doubler la distribution sur une période de 5 jours environ	 Distribution au cours des premiers jours de vie ou dans les jours précédant les périodes de stress (allotement, sevrage). Répéter 6 semaines plus tard sur les animaux les plus sensibles

Gamme gestion du risque digestif lié aux parasites internes

PROTOBOL <i>Bolus de 10 g Pot de 30 boli</i>	TOP démarrage <i>Granulé : 25 kg</i>
<ul style="list-style-type: none"> Accompagne les vaccinations (diarrhées des veaux). Contribue à la gestion du risque digestif lié la présence de protozoaires avant 15 jours (cryptosporidies et coccidies) 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien de la croissance des jeunes veaux, contribuer à maîtrise le transit digestif Contribue à la gestion du risque digestif lié la présence protozoaires (coccidies)
 <p>Veaux laitiers ou allaitants Jeune âge : 1 bolus par veau dès que possible, Prévention des périodes à risque : 1 bolus par veau, à la mise à l'herbe et/ou au sevrage</p>	 <p>Veaux laitiers et allaitants : à disposition des veaux (auto consommation d'argile) ou 30 g/veau/jour (2 distributions de 10 jour à 3 semaines d'intervalle)</p>
NUTRASEM 630 <i>Granulé 15-25 kg</i>	DISTRAL 530 <i>Granulé 15-25 kg Liquide 5- 25 L</i>
<ul style="list-style-type: none"> Accompagne la mise en place de la prémunition immunitaire vis-à-vis des parasites internes Contribue à la gestion du risque digestif lié la présence de parasites gastro-intestinaux et dans la sphère hépatique Forme seau à lécher NUTRABLOC 630 et forme bolus NUTRABOL 	<ul style="list-style-type: none"> Accompagne la mise en place de la prémunition immunitaire vis-à-vis des parasites internes Contribue à la gestion du risque digestif lié la présence de parasites présents au niveau du rumen Forme bolus DISTRABOL
 <p>Pression moyenne : 50g/j pendant 10 jours, renouveler 21 jours plus tard</p>  <p>Pression élevée ou multi-infestation : 50g/j pendant 21 jours, renouveler 21 jours plus tard pendant 10 jours</p>	 <p>Pression moyenne : 50g/j pendant 10 jours, renouveler 21 jours plus tard</p>  <p>Pression élevée ou multi-infestation : 50g/j pendant 21 jours, renouveler 21 jours plus tard pendant 10 jours</p>
Période à l'herbe	Maîtrise des taux cellulaires
MAGOLITRAL <i>Liquide 5 et 25 L</i>	PARABOL <i>Pot de 8 ou coffret de 16 boli</i>
<ul style="list-style-type: none"> Apports d'oligo-éléments au pâturage Participe au maintien du magnésium sanguin et participe à réduire les excès de potasse Capteur et drainage de l'urée, maintien des jeunes gestations Forme Bolus MAGOBOL et seau à lécher NUTRABLOC 30 MG 	<ul style="list-style-type: none"> Accompagnement du fonctionnement de la mamelle Participe à la modulation des taux cellulaires précéder la distribution d'un détoxifiant type EPATRAL
 <p>Distribution au moment de la pousse de l'herbe : 50 ml/vache/j sur une période de 10 jours environ</p>	 <p>1 bolus par vache au cours de la lactation sur les vaches présentant 300 000 à 1 million de cellule Renouveler 40 jours plus tard,</p>